Boletim Epidemiológico - N° 20, Julho/2025

# BOLETIM SEMANAL DAS ARBOVIROSES: CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO MACEIÓ-AL - SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (SE) 1 A 26

## APRESENTAÇÃO

As arboviroses urbanas são doenças infecciosas que representam um grande problema de saúde pública no mundo e no Brasil, transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, possui uma sazonalidade coincidente com os períodos de chuva e com altas temperaturas no país.

Caracterizadas por uma transmissão endêmica/epidêmica variável devido a circulação simultânea dos quatros sorotipos do vírus da dengue, do vírus da Chikungunya e do vírus Zika.

A situação epidemiológica dessas doenças é diretamente influenciada pelas condições sanitárias, urbanas e socioeconômicas das cidades acometidas, e pela capacidade de resposta rápida, organizada e efetiva da gestão local.

## MÉTODOS

Consideraram-se, nas análises epidemiológicas, os casos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN online/Net) e no Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL/LACEN) de residentes de Maceió, no período de 2024 a 2025.

Os dados foram tabulados no software Tabwin do DATASUS em arquivo dbf. e salvos em planilhas da ferramenta Excel da Microsoft Office para análises e interpretações.

As análise espaciais do risco territorial foram desenvolvidas atráves dos softwares de geoprocessamento Qgis e GeoDa.

## ANÁLISE E RESULTADO

### DENGUE

| CASOS PROVÁVEIS | COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA | ÓBITOS CONFIRMADOS |
|---|---|---|
| 679 | 70,57 | 0 |

No mesmo período de 2024 registraram-se 4.801 casos prováveis de Dengue, correspondendo a uma redução na ordem de 85,86% do ano anterior.

De 4 óbitos suspeitos, 0 foram confirmados, 2 descartados e 2 encontra-se sob investigação.

Gráfico 1 - Casos de dengue segundo gravidade, Maceió, 2025.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

O gráfico demonstra que, nas Semanas Epidemiológicas (SE) analisadas, os casos graves correspondem a 1,2% dos casos prováveis.

Gráfico 2 - Casos prováveis de dengue distribuídos por sexo e faixa-etária, Maceió, 2025.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

O gráfico demonstra que as faixas com maior quantidade de casos são: 25 a 34 com 157, seguida da faixa de 15 a 24 com 145 e 35 a 44 com 102 casos.

Gráfico 3 - Distribuição de casos prováveis de dengue por Distrito Sanitário, Maceió, 2025.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

O gráfico demonstra que o 7° distrito concentra o maior número de casos, seguido pelo 2° e pelo 4° distrito.

Tabela 1 - Frequência de casos de dengue segundo gravidade, distribuídos por faixa-etária, Maceió, 2025.

| Faixa-etária | Prováveis | Graves | Leves | Óbitos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 1 ano | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1 a 4 anos | 42 | 1 | 41 | 0 |
| 5 a 14 anos | 90 | 3 | 87 | 0 |
| 15 a 24 anos | 145 | 1 | 144 | 0 |
| 25 a 34 anos | 157 | 1 | 156 | 0 |
| 35 a 44 anos | 102 | 1 | 101 | 0 |
| 45 a 54 anos | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 55 a 64 anos | 33 | 1 | 32 | 0 |
| 65 anos e mais | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Ignorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **679** | **8** | **671** | **0** |

Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

Gráfico 4 - Situação do exame Pesquisa para Arbovírus (ZDC), Maceió, 2025.




Fonte:LACEN/AL-GAL - Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Atualizado em 01/07/2025.

Nos exames realizados, verificou-se que foram identificadas 21 amostras positivas para Chikungunya e 7 positivas para Dengue até a SE analisada. Representando um percentual de positividade de 8% para CHIKV e 2,7% para DENV.

Gráfico 5 - Diagrama de Controle de dengue, Maceió, 2025.




**Nota Explicativa sobre diagrama de controle:**

O Diagrama de controle é um gráfico baseado na teoria de probabilidades que permitem comparar a incidência observada de um determinado evento com os limites máximo e mínimo da incidência esperada. Permite identificar inícios de surtos ou epidemias, sinalizar alertas para situações que devem ser intensificadas as medidas de controle, prevenção e reorganização dos serviços de saúde. O Diagrama analisado compreende um intervalo da linha histórica de 5 anos.

Classificação do Diagrama de Controle:

*Normalidade: Incidência de casos prováveis de dengue abaixo da mediana e dentro do canal endêmico.
*Mobilização: Incidência de casos prováveis de dengue acima da mediana e abaixo do limite superior (Q3) do canal endêmico.
*Alerta: Incidência de casos prováveis de dengue acima do limite superior (Q3) do canal endêmico por 4 semanas consecultivas.
*Epidemia: Aumento exponecial da incidência de casos prováveis de dengue acima do limite superior (Q3) do canal endêmcio.

Fonte: SINAN/IBGE. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

Conforme ilustrado no gráfico, a incidência total de casos prováveis de dengue em Maceió, até a semana analisada, não ultrapassou o canal endêmico, tendo uma incidência máxima de 4,57/100mil hab.
Considerando que o período do ano de maior transmissão, segundo o Ministério da Saúde, ocorre nos meses em que há maior incidência de chuvas em cada localidade avaliada, e que em Maceió, entre os meses de abril a setembro, em condições normais, são esperados grandes volumes de chuvas, as projeções apontam para um aumento do número de casos, aproximando-se da mediana de casos esperada.

## CHIKUNGUNYA

| CASOS PROVÁVEIS | COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA | ÓBITOS CONFIRMADOS |
|---|---|---|
| 32 | 3,33 | 0 |

No mesmo período de 2024 foram registrados 165 casos prováveis de Chikv, correspondendo a uma redução na ordem de 93,02% do ano anterior.

Não houve registro de óbitos no período analisado.

# CENÁRIO DAS ARBOVIROSES, NO PERÍODO DA 1ª A 26ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2025, MACEIÓ-AL

Gráfico 6 - Distribuição dos casos prováveis de chikv por sexo e município de residência, Maceió, 2025.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

Até a semana epidemiológica analisada os sexos masculino e feminino registram a mesma quantidade de casos, 16 no total.

Gráfico 7 - Casos prováveis de chikv distribuídos por sexo e faixa-etária, Maceió, 2025.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

As faixas etárias com maior quantidade de casos são: 35 a 44 com 7, seguida da faixa de 15 a 24 com 6 e 25 a 34 com 5 casos.

Gráfico 8 - Distribuição de casos prováveis de chikungunya por Distrito Sanitário, Maceió, 2025.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

O gráfico demonstra que o 7° distrito concentra o maior número de casos, seguido pelo 4° e pelo 2° distrito.

Tabela 2 - Frequência de casos de chikv segundo gravidade, distribuídos por faixa-etária, Maceió, 2025.

| Faixa-etária | Prováveis | Graves | Leves | Óbitos |
|---|---|---|---|---|
| Menor de 1 Ano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 a 4 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 a 14 anos | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 a 24 anos | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 25 a 34 anos | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 35 a 44 anos | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 45 a 54 anos | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 55 a 64 anos | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 65 anos e mais | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ignorado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **32** | **0** | **32** | **0** |

Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

Gráfico 9 - Diagrama de Controle de chikungunya, Maceió, 2025.




**Nota Explicativa sobre diagrama de controle:**

O Diagrama de controle é um gráfico baseado na teoria de probabilidades que permitem comparar a incidência observada de um determinado evento com os limites máximo e mínimo da incidência esperada. Permite identificar inícios de surtos ou epidemias, sinalizar alertas para situações que devem ser intensificadas as medidas de controle, prevenção e reorganização dos serviços de saúde. O Diagrama analisado compreende um intervalo da linha histórica de 5 anos.

**Classificação do Diagrama de Controle:**

*Normalidade: Incidência de casos prováveis de chikungunya abaixo da mediana e dentro do canal endêmico.
*Mobilização: Incidência de casos prováveis de chikungunya acima da mediana e abaixo do limite superior (Q3) do canal endêmico.
*Alerta: Incidência de casos prováveis de chikungunya acima do limite superior (Q3) do canal endêmico por 4 semanas consecultivas.
*Epidemia: Aumento exponecial da incidência de casos prováveis de chikungunya acima do limite superior (Q3) do canal endêmcio.

Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

Conforme demonstrado no gráfico, a incidência total de casos prováveis de Chikungunya em Maceió, dentro da semana analisada, se manteve, predominantemente, abaixo da mediana de casos, tendo uma incidência máxima de 0,42/100.000 hab.

Considerando que o período do ano de maior transmissão, segundo o Ministério da Saúde, ocorre nos meses em que há maior incidência de chuvas em cada localidade avaliada, e que em Maceió, entre os meses de abril a setembro, em condições normais, são esperados grandes volumes de chuvas, as projeções apontam para um aumento do número de casos, aproximando-se da mediana de casos esperada.

# DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE CASOS PROVÁVEIS DA 1ª A 26ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2025, MACEIÓ-AL

Mapa 1 - Distibuição espacial de dengue da 1ª a 26ª semana epidemiológica de 2025, Maceió/AL.




A análise por Distrito Sanitário até a 26ª SE demonstra o 4° Distrito Sanitário com a maior incidência por 100mil hab. Entre os bairros destacam-se: Centro (441,13/100 mil hab.), Pajuçara (209,86/100 mil hab) e Pescaria (136,66/100 mil hab.).

Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

Mapa 2 - Distibuição espacial de chikungunya da 1ª a 26ª semana epidemiológica de 2025, Maceió/AL.

A análise por Distrito Sanitário até a 26ª SE demonstra o 4° DS com a maior incidência por 100mil hab. Entre os bairros destacam-se: Centro (49,29 casos/100mil hab), Pajuçara (28,04 casos/100mil hab) e Pinheiro (18,76 casos/100mil hab.).

Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

# ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO TERRITORIAL

Mapa 3 - Conglomerado de casos prováveis de dengue no ano de 2024, em Maceió/AL.




Mapa 4 - Conglomerado de casos prováveis de dengue no ano de 2025, em Maceió/AL.




Fonte: SINAN. Dados Parciais, sujeitos à alteração. Atualizado em 01/07/2025.

A estratificação de risco territorial permite a análise de conglomerados de casos de arboviroses no município. Os resultados evidenciam a existência de hotspots (áreas com elevada concentração de casos) que devem ser priorizados pelas políticas públicas para a prevenção e controle destas doenças, bem como a definição de áreas prioritárias para ações de pronta resposta.

A análise dos mapas evidencia que no ano de 2024 a alta transmissão dos casos de dengue concentrou-se nos bairros: Cidade Universitária (7° DS), Antares (6° DS), Jacarecica, Guaxuma, Garça torta e Riacho doce (8° DS), destacando-se como áreas com maior risco de transmissão da dengue. Já o ano de 2025 a alta transmissão dos casos prováveis apresenta-se, até a SE analisada (SE 26), nos bairros: Tabuleiro dos martinhs, Santos Dumont, Cidade universitária, Santa lúcia (7° DS) e Antares (6° DS). Os hotspots de transmissão de Zika e Chikungunya se superpõem geograficamente aos de dengue. O controle focalizado nas áreas de alta transmissão pode ser mais efetivo, e assim contribuir para ações de controle vetorial mais assertivas.

## OUTRAS ARBOVIROSES, NO PERÍODO DA 1ª A 26ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2025, MACEIÓ-AL

### ZIKA

Até a SE analisada o município possui 11 casos notificados, sendo 8 descartados, 1 confirmado por critério laboratorial após investigação e 2 casos encontram-se sob investigação.

### MALÁRIA

Neste período, houve um (1) caso confirmado, proveniente do estado Roraima, e um (1) caso confirmado proveniente da África.

### FEBRE AMARELA

O município não possui transmissão autóctone. Em 2025 não há registro de casos suspeitos.

### FEBRE OROPOUCHE

O município não possui transmissão autóctone. Em 2025, até a SE analisada, não há registro de casos suspeitos.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atual cenário epidemiológico no Brasil e, particularmente em Maceió, evidencia que as ações de vigilância, o monitoramento e o controle vetor constituem pilares fundamentais para o enfrentamento da doença. A integração eficaz destas estratégias depende de dados epidemiológicos e entomológicos acurados para, assim, possibilitar a identificação precoce de áreas de risco, bem como a adoção de medidas de controle direcionadas, e o melhor preparo da assistência para o manejo dos casos.

## RECOMENDAÇÕES

- ✓ Realizar ações de educação em saúde e mobilização social, com ênfase na mudança de hábitos para prevenção e controle do vetor;
- ✓ Intensificar as ações de educação permanente para os profissionais de saúde para a identificação de casos suspeitos em tempo oportuno;
- ✓ Informar a população e a gestão sob risco de epidemias buscando a prevenção e promoção da saúde.

Informamos que as alterações adotadas, a partir desta edição, foram para adequação às orientações do Ministério da Saúde para a análise do cenário das arboviroses. Para fins de ações de vigilância, consideram-se casos prováveis, todos os casos notificados, exceto os casos descartados.

## REFERÊNCIAS


Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. **Guia de vigilância em saúde : volume 2 [recurso eletrônico]** / Ministério da Saúde, Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. – 6. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 3 v. : il. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_v2_6edrev.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância de Arboviroses. **Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle das Arboviroses Urbanas: Vigilância Entomológica e Controle Vetorial [recurso eletrônico]** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral de Vigilância de Arboviroses – Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_arboviroses_urbanas.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Doenças Transmissíveis. **Plano de contingência nacional para dengue, chikungunya e Zika [recurso eletrônico]** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de de Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_contingencia_nacional_dengue_zika.pdf

ALAGOAS. Secretaria de Estado da Saúde. Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde. Superintendência de Vigilância e Controle de Doenças. Gerência de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis. Assessoria Técnica em Vetores, Zoonose e Fatores Ambientais. **Plano Estadual para Enfrentamento das Arboviroses**. 3° edição- Alagoas, 2025.

Maceió. Secretaria Municipal de Saúde. Diretoria de Atenção a saúde. Diretoria de Vigilância em Saúde. **Plano Municipal para Enfrentamento das Arboviroses Urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika**. 1° edição (2024-2026), Maceió, 2024.


## EXPEDIENTE


Secretário Municipal de Saúde: Claydson Duarte Silva de Moura;
Secretária Adjunta de Gestão da Saúde: Roberta B. de Moraes;
Diretora de Vigilância em Saúde: Natália de Sá Cavalcante Alves Pinto;
Coordenação Geral de Vigilância em Saúde: Júlia Manoela Rocha de Oliveira;
Coordenação de Vigilância das Doenças e Agravos Transmissíveis e Não Transmissíveis: Rosicleide Barbosa da Silva;
Área Técnica das Arboviroses/Equipe de elaboração: Ana Lídia de Mesquita Farias e Cynthia Dannielle Wanderley da Rocha;
Endereço eletrônico: vigiepidsmcz@gmail.com/ dengue@sms.maceio.al.gov.br.